~~[illegible]~~
~~[illegible]~~

Exposition simple et naturele de ce qui s'est trouvé dans le corps de feu m.r de maupou archeveque d'auch par l'ouverture de son cadavre faite par nous soussignés le 12 juin 1712

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Premierement apres avoir levé les tegumens & les muscles du bas ventre, l'estomach et les intestins nous ont paru dans l'etat naturel, l'epiploon etoit asses garny de graisse sans etre dessechè & les glandes du mezentaire sans obstruction.

Il est vray qu'ayant examiné l'estomach et les intestins en dedans apres les avoir detachés des autres parties, le premier s'est trouvé un peu relaché enduit dans toute l'etendue de sa superficie interne d'une muscosité gluante et visqueuse, il y paroissoit pourtant certaines vides qui marquoient que le relachement n'etoit pas total. nous remarquames enfin une legere Inflammation qui s'etendoit vers l'orifice superieur, il en parut encore dans l'intestin ilion.

Ces parties otées et examinées il nous a paru une grosse tumeur du coté droit au dessous du foye auquel elle etoit legerement adherente dans sa partie concave et laterale vers l'extremite du lobe du coté des vertebres sur laquelle ayant posé nos mains nous ressentimes un flotement Considerable.

Cette tumeur ouverte il en coula deux taces et demi de pus que l'on prit soin de mesurer a la mesure de cette ville, lequel etoit de couleur de lie de vin que nous trouvames contenu dans une poche

membraneuse *sine Kistis* dans lequel nous trouvames six differentes loges qui pouvoient se Communiquer des unes aux autres, toutes pourtant bien distinctes & separées par des cloisons membraneuses.

Ce pus vuidé nous detachames ce sac en entier avec le foye auquel il etoit adherant, et ce dernier nous ayant paru Schirreux et blanchatre dans sa partie laterale de la largeur de cinq travers de doigt, et recouvert d'un pus blanchatre de la consistance de platre un peu detrempé, nous nous attachames a rechercher si cette tumeur auroit pris son origine du foye ou si celuy cy auroit été gaté par le Contact de l'autre.

Il nous parut que le foye n'avoit pas été abcedé et qu'il etoit devenu Schirreux et blanchatre dans cette partie selon toute apparance par le Contact des matieres qui venoient par la tumeur, dautant mieux que le reste du foye etoit dans l'etat du monde le plus naturel et par raport a sa Couleur et par raport a sa Consistance, et cequi nous parut plus Surprenant fut de trouver que La blancheur et la Consistance Schirreuse de la partie gatée etoit la meme dans toute sa Substance, cequi nous a paru par quatre taillades faites dans toute letendue de l'extremité gatée, il ne s'est presque pas trouvé de bille dans la vesicule du fiel.

Cette perquisition faite ayant voulu nous attacher a l'examen de cette poche membraneuse, nous l'avons trouvée epaisse

deprés d'un travers de doigt dans la partie superieure de la
quelle nous trouvames un corps glanduleux et blanchatre qu'elle
renfermoit, il etoit d'une figure si bizarre et si irreguliere
qu'il n'auroit pas eté possible de demeler que c'eut eté le rein
droit si nous n'avions veu que c'etoit la sa place et remarqué
ses adherances, si fort il etoit defiguré et par la couleur et
par l'eloignement de sa structure naturelle, ayant enfin reconnu
que c'etoit le rein puisqu'il ne se trouva autre chose en place
de ce coté droit, nous jugeames que ce dont il etoit envelopé
etoit sa membrane commune et adipeuse que par son
accroissement & son alongement avoit formé ce grand Kistis
qui Contenoit le pus.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Nous trouvames la plus grande partie de ce rein Corrodée par
un pus epais de la consistance de platre detrempé et apeuprés
semblable a la matiere qui sortit par l'ouverture de la tumeur
exterieure, nous le vuidames de certaines celules ou il etoit
enfermé dans lesquelles nous trouvames cinq corps apierris
en maniere de polipe, dont les quatres representoient la
figure irreguliere des branches de corail, ~~et~~ et l'autre etoit ~~rond~~
rond moins dur et plus gros, apeuprés comme une noix muscade,
tous cinq etoient tout a fait noirs que nous avons jugé etre des
grumeaux de sang desseches et apierris que nous gardons encore.

or Les endroits d'ou nous les retirames nous paroissent etre
de restes du bassin de l'uretre ou des autres vaisseaux —
aboutissans aux reins qui bouchoient entierement ces conduits,
et qui selon toute apparance empechoient que rien ne peut
tomber dans la vescie, d'autant mieux que l'autre partie
du rein etoit blanchatre et schirreuse d'une maniere a ne —
pouvoir pas permettre la separation de l'urine.
apres avoir vuidé tout ce pus nous eumes la curiosité de peser
ce reste de rein informe avec son sac membraneux & alongé qui
peserent deux livres et demi
Nous apperceumes en meme temps une petite tumeur en —
maniere d'hidatide sur la partie moyenne et convexe du —
foye non alterée qui ayant été ouverte laissa couler une
Lymphe fluide enfermée dans un petit Kistis qui ne penetroit
pas fort avant dans sa substance, il auroit pu Contenir
une noisette dans sa Cavité.
Le Rein gauche etoit beaucoup plus gros et plus long qu'il
ne doit etre, nous l'attribuames au reflux du sang qui ne —
pouvoit pas bien circuler dans le droit, il etoit d'ailleurs dans
l'etat naturel et par raport a sa couleur et par raport a sa
Consistance dans le corps duquel nous n'avons trouvé —
aucun calcul.

La vessie etoit dans l'etat naturel nous n'avons rien
trouvé ni dans sa cavité, ni dans son col, ni dans l'uretre.
La Glande quil avoit sur la region du pubis du coté droit,
avoit beaucoup grossy, pendant le cours de la maladie —
nous l'avons trouvée comme une grosse noix, et l'ayant —
voulu presser entre les doigts aprés avoir levé les tegumens,
il en coula une matiere blanche en forme de fromage quón
exprime entre les doigts en serrant la main qui en sortant
formoit une Colomne apeuprés semblable a la moëlle
de sureau.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Le foye enlevé de la capacité du bas ventre avec le reines
Le Kistis nous laissa l'ouverture de la tumeur exterieure.
precedement ouverte, fort libre et fort apparante, il n'y avoit
que le periloine et le bout du lobe du foye garte qui repondoient —
directement au trou et qui en format la cloison, de sorte que
quand bien l'ouverture auroit penetré endedans nous —
estimons que le pus contenu dans le Kistis Interieur n'auroit
jamais pû se vuider par la, parceque d'un coté il etoit —
situé au dessous, & que d'ailleurs le sac etoit trop epais pour
esperer que le pus le ~~cavdat~~ corrodat et l'ouvrit pour s'y faire issue —

a travers ce jour il auroit eu tout au plus que le pus de rien
qui auroit glissé jusques au foye qui auroit du etre vuidé
s'il eut eu moins de Consistance, ce qui ne nous permit pas
de douter que la tumeur exterieure etoit distincte et separée
de l'interieure quoyque de meme nature.

Le Kistis de la tumeur exterieure prenoit un travers de doigt
au dessous de la derniere des fausses cotes, et s'etendoit deux
travers de doigt au dessus de la penultieme, nous avons trouvé
le bout de ces deux cotes carié de la longueur de deux travers
de doigt dont les bouts se brisèrent aisement

après avoir parcouru avec exactitude toutes les parties du bas
ventre nous examines le cœur et les poumons contenus
dans la capacité du moyen nous trouvames pus
des cerosités claires et transparantes dans la poitrine des
deux cotés et plusieurs adherences des poulmons a la pleure
nous apperceumes une inflammation dans des deux lobes
du sang qui commancoit à suppurer dans presque
toute leur etendue que nous avons jugé avoir été occasionée
huit ou dix jours avant sa mort seulement, nous n'y
trouvames ny durillon ny schirre.

Le Cœur me parut beau et asses humecté quoyquil ny eut pas de serosités dans le pericarde, nous n'avons trouvé aucun polype ny dans oreillettes ny dans les ventricules, ny dans les vaisseaux qui y aboutissent.

arrivés enfin au ventre superieur le crane enlevé le cerveau nous parut un peu plus mollace quil ne doit etre dans son etat naturel, Les vaisseaux qui rampent sur la piemere et audedans etoient gros et enquelque maniere variqueux remplis d'un sang inanimé qui paroissoit sereux, nous avons remarqués enfin la piemere et la substance du cerveau une serosité aiqueuse.

Les deux ventricules du cerveau ouverts nous y avons trouvé beaucoup de serosités, les glandes du plexus coroide qui les tapisse, etoient tres apparentes et plusieurs comme des grains de millet, Les autres parties internes du cerveau nous ont parû dans l'etat naturel et par raport a leur couleur et par raport a leur Consistance.

Signés Larrieu, Colᵒ Gardan

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE